



CONTRA GARRAPATAS PULGAS Y PIOJOS  
EN PERROS DE TODAS LAS RAZAS



<b>Registro ICA No. 6303 - MV</b>	<b>Vida Útil:</b> 36 Meses	<b>Fabricante:</b> Bayer México
<b>Presentaciones de Venta:</b> Caja x 1 Jabón x 100 g		
<b>Concepto Toxicológico:</b> MP-13339-2003		<b>Licencia Ambiental:</b> Resolución 1463
<b>Composición garantizada:</b>	Cada 100 g contienen: Coumaphos.....1 g Excipientes c.s.p .....100 g Este producto puede perder hasta el 10 % de su peso.	
<b>Forma farmacéutica:</b>	Jabón en barra	
<b>Indicaciones:</b>	En perros para el control de garrapatas ( <i>Rhipicephalus Sanguineus</i> ), pulgas ( <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> ) y piojos ( <i>Trichodectes canis</i> , <i>Linognathus setosus</i> ).	
<b>Modo de empleo:</b>	Mojar bien el perro. Enjabonando hasta obtener abundante espuma, friccionar la misma sobre el pelaje y la piel, dejar actuar por 5 minutos y enjuagar totalmente. Después del lavado de Asuntol no usar otro jabón.	
<b>Precauciones:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Para uso externo únicamente.</li> <li>*Use guantes. Evite la ingestión y el contacto directo del producto con la piel ojos y boca. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.</li> <li>*No beber, comer o fumar cuando use el producto.</li> <li>*Después de usar el producto, retire la ropa mojada, lávese las manos y piel con agua y jabón.</li> <li>*No almacenar cerca de alimentos concentrados o bebidas.</li> <li>*Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25°C</li> <li>*No reutilizar la jabonera con jabones de uso humano.</li> <li>*Este producto contiene un organofosforado.</li> <li>*En caso de intoxicación en humanos llame al Médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de la etiqueta.</li> <li>*En caso de intoxicación del animal llame al médico veterinario.</li> <li>*NO UTILIZAR EN GATOS.</li> </ul>	
<b>Recomendaciones</b>	Lleve a su perro regularmente al Veterinario	
<b>En caso de intoxicación;</b>	<p><b>Antídoto:</b> Sulfato de Atropina al 0.1%. Dosis para humanos: 2 - 4 mg (equivalente a 2 - 4 mL) por vía IV lenta cada 5 a 10 minutos hasta conseguir signos de atropinización.</p> <p>Dosis para animales: 0.25 mg /kg de peso vivo (equivalente a 2.5 mL por cada 10 kg de peso vivo). Aplicar 1/4 parte de la dosis vía IV lenta y el restante vía IM o SC. Observar el animal permanentemente y de acuerdo a la sintomatología, repetir el tratamiento cada 6 a 12 horas.</p> <p>En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia 01-8000916012, Ecuador: 1800-50-3005.</p>	
<b>Condiciones del almacenamiento:</b>	Mantener en un lugar fresco y seco a menos de 25°C	
<b>Material de empaque:</b>	Caja de cartón, uno de sus extremos es de cierre manual. Jabonera plástica transparente	

\*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.  
Ficha Técnica - Asuntol Jabón.xlsx