

Chalver

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

Avenida 68 No. 37B –31 Sur

Conmutador: 724 60 00; Fax Ext.4337

Correo Electrónico: direccion.tecnica@chalver.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

FICHA TECNICA

PRODUCTO

INFLACOR®

PRINCIPIO. ACTIVO

BETAMETASONA SODIO FOSFATO

CONCENTRACIÓN

2 mg/ mL

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE



FORMA DE

Envase en posición vertical

ALMACENAMIENTO

Lugar fresco y seco

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

La temperatura de almacenamiento no debe exceder los 30°C

CARACTERÍSTICAS POR LAS CUALES SE DEBE DESECHAR.

Solución con partículas

Cumplida la fecha de vencimiento

METODO DE DESTRUCCIÓN

Disponer del producto por incineración en un incinerador aprobado para destrucción. Siga siempre las disposiciones legales vigentes.

FORMA DE EMPLEO

Intramuscular, intravenosa, subcutánea.

La dosis intravenosa es de 10 mg (5 mL) diluida en 500 mL de solución con glucosa.

Frecuencia y duración del tratamiento a criterio del médico veterinario.

USO

Anti- Inflamatorio

INDICACIONES

Esta indicado para bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos. **Inflacor®** es un corticosteroide sintético de máxima potencia antiinflamatoria y gluconeogénica y mínimo efecto mineralocorticoide, de duración larga, eficaz en el tratamiento de enfermedades en las que debe controlarse inflamación, dolor y prurito. En casos agudos e hiperagudos por traumatismos, shock hipovolémico (hemorragia), shock anafiláctico, alergias y toxemias bacterianas. Afecciones metabólicas como cetosis, fiebre de leche, agalactia, laminitis (infosura) y otras de etiología mixta.

En laminitis (infosura) los objetivos de la terapia son remover el factor desencadenante, aliviar el dolor, suprimir la inflamación, mejorar el flujo sanguíneo capilar, aumentar la síntesis de queratina y prevenir la infección secundaria.

Chalver

LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.

Avenida 68 No. 37B –31 Sur

Conmutador: 724 60 00; Fax Ext.4337

Correo Electrónico: direccion.tecnica@chalver.com.co

Bogotá D.C. - Colombia

FICHA TECNICA

PRODUCTO

INFLACOR®

PRINCIPIO. ACTIVO

BETAMETASONA SODIO FOSFATO

CONCENTRACIÓN

2 mg/ mL

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE



INDICACIONES

Inflacor® actúa reduciendo la inflamación y el dolor. Mejora el flujo capilar, preservando la integridad de los capilares sanguíneos, disminuyendo la agregación de plaquetas o trombocitos, de glóbulos rojos y causando vasodilatación.

En cetosis primaria (acetonemia) la rápida y sostenida actividad de **Inflacor®** después de la inyección intramuscular de 20 mg (10 mL), produce elevación de la glucosa sanguínea, deprime la formación de cuerpos cetónicos. El retorno de estos a niveles normales ocurre entre el segundo y tercer día. La producción de leche y el apetito inician su recuperación entre el segundo y el tercer día.

Enfermedades de la piel: agudas o crónicas, dermatitis alérgicas, irritaciones, incluyendo las producidas por agentes fisicoquímicos, picaduras de insectos, arácnidos. Plantas tóxicas, fotodermatitis, afecciones por alimentos o medicamentos, intertrigo, dermatitis seborreicas y pruritos crónicos.

Enfermedades de los ojos: Afecciones alérgicas e irritativas del segmento anterior, párpados, conjuntiva, córnea y esclerótica.

Inflamación traumática de músculos y articulaciones, artritis, bursitis, osteoartritis, tendosinovitis, tendinitis, laminitis.

Coadyuvante en afecciones alérgicas, cuadros anafilácticos, síndrome de vaca caída.

Ruth Castillo

Directora Técnica

Q.F. Universidad Nacional

T.P. No.6586